

С Б-ей помощью

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТКИ
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДОМ ИНЪЕКЦИЙ МЕТОТРЕКСАТА
ПОСЛЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ**

מידע למטופלת טיפול בזריקות – METHOTREXATE לאחר אבחנה של הריון חוץ רחמי

Уважаемая пациентка!

Ваш врач недавно посоветовал Вам избавиться от внематочной беременности с помощью инъекций препарата метотрексат.

В данном информационном листке Вы найдете сведения, которые помогут Вам в ходе лечения и последующего наблюдения, которое вы пройдете в ближайшее время.

Предыстория –

Инъекции будут проводиться медсестрой отделения; она же проведет с Вами инструктаж по поводу необходимого последующего наблюдения.

Метотрексат – это лекарственный препарат, принадлежащий к группе химиотерапевтических лекарств. Этот препарат обладает различными побочными эффектами, такими как повышение уровня ферментов печени, сыпь, выпадение волос, воспаление слизистой рта (стоматит), тошнота, понос и подавление костного мозга.

При лечении внематочной беременности инъекция выполняется одноразово и в низкой дозе и потому побочные эффекты такой инъекции обычно незначительны и проходят без необходимости в дополнительном лечении. Наиболее часто встречающийся побочный эффект – это боли в животе, являющиеся следствием выкидыша из маточной трубы, или появление сгустков крови (гематом) в данной области.

Лечение – (в больнице «Шаарей Цедек»)

Введение одноразовой инъекции (single dose) метотрексата с последующим наблюдением с использованием анализов крови, выполняемых на четвертый и седьмой день после инъекции (день инъекции = день 0). В случаях, когда между четвертым и седьмым днем не наблюдается снижения уровня бета-ХГЧ (хорионический гонадотропин) не менее, чем на 15%, рассматривается возможность проведения дополнительной инъекции.

Если у Вас группа крови с отрицательным резус фактором (RH), медсестра также сделает Вам прививку антирезусного иммуноглобулина (anti-D).

Последующее наблюдение –

В случае снижения уровня бета-ХГЧ после инъекции в достаточной мере, дальнейшее наблюдение за уровнем бета-ХГЧ в анализах крови осуществляется 1 раз в неделю. Наблюдение в клинике завершается, когда уровень бета-ХГЧ снижается, по крайней мере, до менее 100. После этого Вы будете находиться под наблюдением в больничной кассе до тех пор, пока уровень бета-ХГЧ не снизится, по крайней мере, до менее 10.

Приблизительный период окончания беременности после инъекции – 3 -7 недель.

В ходе последующего наблюдения Вас попросят, насколько это возможно, обеспечить себе полный покой.

При каждом посещении клиники Вы получите от врача индивидуальные указания по дальнейшему наблюдению, инструкции относительно следующей даты наблюдения и относительно поведения в домашних условиях.

Вам следует записаться на прием для последующего наблюдения в «Клинике амбулаторного наблюдения» (тел. 6555999).

Просим Вас явиться точно в назначенное время, что обеспечит Вам и остальным пациенткам регулярное и удобное наблюдение в клинике.

<p>Просим обратить внимание! В приведенных ниже случаях Вам следует как можно быстрее, не дожидаясь следующей даты наблюдения, вернуться в приемное гинекологическое отделение больницы «Шаарей Цедек»:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Сильные боли в животе * Обильное вагинальное кровотечение * Повышение температуры * Слабость или обморочное состояние 	<ul style="list-style-type: none"> * Вам следует в течение 3 месяцев после последней полученной инъекции принимать противозачаточные средства. * В течение определенного периода времени Вам запрещается грудное вскармливание: каждый отдельный случай рассматривается индивидуально. Для получения указаний следует связаться с одним из токсикологических центров Израиля (Токсикологический центр г. Хайфы 04-8541900) * В течение 72 часов после введения инъекции следует пользоваться отдельным туалетом. В качестве альтернативы можно несколько раз смыть воду в туалете и убедиться, что он чистый.
---	---

По любому вопросу можно позвонить

с воскресенья по четверг с 8:00 до 15:00

Канцелярия: 02-6555182

Медсестринский кабинет: 02-6555683, 02-6666860

Факс в медсестринском кабинете: 02-5645309

Составлено: Тамар Вайцман – ответственной медсестрой гинекологической клиники и Михаль Бен Дор – медсестрой гинекологической клиники

Врачебная валидация: проф. Беллер и д-р Хатив

Обновлено: 12.2015 г.