


מידע למטופלת קוניזציה של צוואר הרחם

Loop electrosurgical excision procedure (LEEP)



מטופלת יקרה,

הנך מופנית לקוניזציה של צוואר הרחם (כריתת חרוט) באמצעות לולאה חשמלית.

רקע ומטרת הפעולה:

בקוניזציה מתבצעת הסרה של חלק קטן (בצורת חרוט) מצוואר הרחם.

הפעולה היא אבחנתית וטיפולית ומתבצעת במקרים של:

1. צורך באבחון בעזרת ביופסיה (דגימת רקמה) רחבה כאשר התקבלה תוצאה לא תקינה של בדיקת סקר לסרטן צוואר הרחם (פאפ) ו/או של בדיקת קולפוסקופיה.

2. טיפול בנגע טרום-סרטני

החלק שיוסר הוא בגודל של כ-2-3 ס"מ וצוואר הרחם צפוי להחלים תוך שלושה עד ארבעה שבועות.

ניתן לבצע את הפעולה בהרדמה מקומית עם אלחוש ע"י הזרקת אלחוש לצוואר הרחם, בדומה לטיפול שיניים או במסגרת אשפוז יום תחת הרדמה כללית (טשטוש).

במהלך הטיפול אינך צפויה לחוש כאבים כלל.

אם את רגישה לחומרי הרדמה או תרופות כלשהן חשוב לומר זאת לפני הטיפול.

סיבוכים אפשריים:

הסיבוכים הינם נדירים וכוללים: דימום מוגבר, זיהום, דלקת בדרכי השתן, ובאופן נדיר ביותר - פגיעה באיברים סמוכים או היצרות תעלת צוואר הרחם.

יש ככל הנראה עליה קלה בסיכון לאי ספיקה של צוואר הרחם שעלולה להביא ללידה לפני שבוע 37 במקרים חריגים של כריתה נרחבת או קוניזציות חוזרות.

חשוב לציין שפעולה זו אינה פוגעת בפוריות או באפשרות ללדת לידה רגילה.

מרפאת טרום ניתוח:

ברוב המקרים לא תתבקשי לעבור הערכה במרפאת טרום ניתוח.

אם יש צורך לביצוע הערכה של מחלות רקע, תקבלי הפנייה למרפאת טרום ניתוח.

במקרה כזה, חשוב לוודא כי יש בידייך התחייבות מתאימה, מכתב סיכום מרופא משפחה ובדיקות ואישורים נוספים אותן התבקשת להביא.

מרפאת טרום ניתוח נמצאת בקומה 5. התהליך כולל פתיחת תיק בדלפק הקבלה, קבלה רפואית, קבלה

סיעודית ובדיקת מרדים. הביקור במרפאת טרום ניתוח אורך כ-4 שעות, בסיומן תחזרי לביתך ותקבלי זימון למועד הפעולה בתוך שבועיים.

יום ביצוע הפעולה:

✓ יש להגיע עם מלווה ומומלצת מנוחה בבית ביום הטיפול

✓ יש להגיע בצום – אין לאכול 6 שעות לפני שעת הניתוח שנקבע לך. ניתן לשתות מים עד שעתיים לפני

הניתוח

✓ עליך ליטול את התרופות הקבועות כרגיל – כולל תרופות לאיזון לחץ דם (עם מעט מים) אלא אם קיבלת

הוראה רפואית מפורשת אחרת

- ✓ יש להגיע לאשפוז יום כירורגי בקומה 2 עם התחייבות והמסמכים שנתבקשת להביא
- ✓ תתקבלי על ידי אחות שתבצע בדיקות ומדידות חיוניות כגון לחץ דם ודופק
- ✓ תתבצע קבלה רפואית
- ✓ תתבקשי להחליף הבגדים לכתונת אשפוז
- ✓ שליח יעבירך לחדר הקבלה לחדר ניתוח, שם תפגשי את המרדים והרופא המנתח
- ✓ בסיום הפעולה תועברי חזרה לאשפוז יום כירורגי להתאוששות למשך כשעתיים

לאחר הפעולה:

- ✓ ייתכן שתחושי כאבים בבטן התחתונה המזכירים כאבי מחזור.
- ✓ ניתן ליטול תרופות משככות כאבים (למשל: אופטלגין, אקמול).
- ✓ ייתכן דימום קל - בינוני למשך 2-3 שבועות או הפרשה נרתיקית מוגברת.

הנחיות לאחר הטיפול:

- ✓ מומלץ להימנע למשך שבועיים מפעילות גופנית מאומצת, הרמת משאות כבדים ועבודה פיזית קשה.
- ✓ במשך חודש אל תשתמשי בטמפון, הימנעי מיחסי מין, שטיפות פנימיות ובדיקות פנימיות.
- ✓ יש להגיע חודש לאחר הטיפול לביקורת במרפאת נשים (קומה 9 בבניין הדור הבא) לבדיקה ולקבלת תשובת פתולוגיה והנחיות להמשך מעקב.

יש לפנות לבדיקת רופא נשים באופן מיידי במקרה של:

- ✓ הופעת דימום רב יותר מווסת המלווה בקרישי דם
- ✓ חום גבוה יותר מ 38
- ✓ הפרשה בעלת ריח רע
- ✓ כאבים משמעותיים בבטן תחתונה שאינם מגיבים למשככי כאבים
- ✓ הרגשה כללית רעה

נשמח לענות על כל שאלה בטלפון:

במקרים דחופים: 02-6555557

במקרים שאינם דחופים: 02-6666644

בברכת החלמה מהירה

צוות מחלקת נשים, המרכז הרפואי-שערי צדק