




## מידע להורים

### לאחר ביצוע ברונוכוסקופיה בילדים

הורים יקרים,  
ילדכם עבר היום בדיקת ברונוכוסקופיה.  
לפניכם מידע אודות מהלך הפעולה ומספר הנחיות חשובות אשר יאפשרו מהלך התאוששות תקין של ילדכם.



#### מהי בדיקת ברונוכוסקופיה?

בדיקה הנעשית תחת הרדמה, בה מוחדר סיב פיברואופטי (צינור גמיש שבקצהו מצלמה) הסוקר את דרכי האוויר במטרה לאבחן /או לטפל בבעיות שונות במערכת הנשימה. הסיב מוחדר דרך האף אל הלוע ומשם לקנה ולסמפונות.

#### מה חשוב לדעת?

- ❖ ילדכם עבר הרדמה ונמצא כעת בשלבי התעוררות, נסו לא להעיר אותו. תנו לו להתעורר בזמן המתאים לו.
- ❖ ההרדמה המקומית (באזור קנה הנשימה) שניתנה לילדכם, גורמת לדיכוי רפלקס הבלעה.
- ❖ בשלב הראשון האחות המטפלת תנחה אתכם לתת לילדכם לשתות נוזלים צלולים.
- ❖ בהמשך תונחו להמתין כשעה אחת (עד שתפוג השפעת ההרדמה) לקבלת אישור האחות המטפלת להאכיל את ילדכם
- ❖ לעיתים, חומרי הטשטוש וההרדמה עלולים לגרום לבחילה, רעד, בלבול והקאות. תופעות אלו חולפות לאחר זמן קצר.
- ❖ ייתכן דימום קל מרירית האף ותחושת גירוי באף ובגרון לאחר הבדיקה
- ❖ אם הילד שב להיות עירני, סימנים חיוניים תקינים, מרגיש טוב ואינו חש כאבים - נשחרר אתכם הביתה כשעתיים מסיום הבדיקה
- ❖ תתכן תחושת עייפות ביום הפעולה - רצוי להישאר בבית בהשגחת מבוגר ולהימנע מפעילות גופנית מוגברת.
- ❖ יום למחרת הבדיקה ניתן לחזור לפעילות רגילה

#### שימו❤️:

- ❖ נרצה לראות כי לילדכם מסוגל לאכול – לא נוכל לשחררו טרם כך
- ❖ אין לצאת ללא מכתב שחרור הכולל הוראות להמשך טיפול ומעקב
- ❖ אם לקחנו לילדכם דגימות לתרבית, יש לברר תשובות לאחר 5 ימים במזכירות מרפאת ריאות ילדים בטלפון 02-6666292
- ❖ אם חום גופו של ילדכם עולה - יש לתת נורופן או אקמול
- ❖ במקרים של: חום גבוה (מעל 38 מעלות צלזיוס), קוצר נשימה, דימום משמעותי מהאף / הפה או התנהגות חריגה יש לפנות למיון ילדים או ליצור קשר עם מזכירות המרפאה

צוות מרפאת ריאות ילדים ישמח לענות לשאלותיכם בטלפון : 02-6666292

רפואה שלימה

צוות אשפוז יום ילדים