


מידע למטופל

ברונכוסקופיה



רקע

ברונכוסקופיה הינה בדיקה המתבצעת ע"י רופא ריאות באמצעות ברונכוסקופ צינור גמיש ודק עם סיב אופטי ומצלמה בקצהו. הבדיקה מאפשרת הסתכלות בדרכי הנשימה העליונות והתחתונות של הריאות והסמפונות. הברונכוסקופ – מוחדר דרך האף ומיתרי הקול לקנה הנשימה. הבדיקה נעשית תחת טשטוש המוזרק לווריד, והרדמה מקומית של הגרון והאף.

מטרת הבדיקה

אבחון וטיפול במצבים כגון דלקת ריאות וזיהומים שונים, דימום, שאיפת גוף זר, שיעול ממושך, קוצר נשימה וגידולי ריאה. הבדיקה מאפשרת זיהוי מדויק של ממצא בבדיקת הדמיה. ניתן לבצע שטיפת ריאה ולדגום רקמת ריאה לבדיקה היסטולוגית.

סיבוכים אפשריים

- מדובר בבדיקה פולשנית אך בטוחה למדי.
- תיתכן תגובה אלרגית לחומר המאלחש, ישנוניות יתר או אי שקט.
- לעיתים יתכנו פגיעה במיתרי הקול, זיהום, ודימום בגלל נקב בריאה.
- לעיתים נדירות נצפות הפרעות בנשימה והפרעות בקצב הלב.

הכנה לבדיקה

- יש להיות בצום שש שעות לפני הבדיקה כולל שתיה.
- במידה והנך מטופל בתרופה לדילול דם או נוגדי קרישה.
- חובה להתייעץ עם רופא ריאות בנוגע לצורך בהפסקת נטילת התרופה 5-7 ימים לפני הבדיקה.
- תרופות נוגדות קרישה הינן: אספירין (MICROPIRIN /ASPIRINE /CARTIA), פלוויקס (PLAVIX), קומדין (COUNADIN), סינטרום (SINTROM), קלאקסן (CLEXANE), קסרלטו (XARELTO).
- **אין להפסיק טיפול במדללי דם ללא התייעצות עם רופא מטפל !!!**

בוקר הבדיקה

- עליך להמשיך ולהקפיד על צום מלא !!
- יש להגיע עם מלווה לקומה 4 לדלפק אף אוזן גרון ומכון ריאות.
- הבא אתך: התחייבות מקופת חולים או הסדר תשלום בהתאם להנחיית מזכירת המכון ריאות, הפנייה מרופא ריאות, מכתב מרופא משפחה עם סיכום מחלות רקע ורשימת תרופות קבועות, רגישויות, תוצאות בדיקות דם, אק"ג על פי דרישת רופא, תוצאות סי טי עם הדיסק, צילומי רנטגן, מיפוי PET.
- ניתן ליטול תרופה להורדת לחץ דם עם מעט מים עד שעתיים לפני הבדיקה.
- אין לקחת תרופות להורדת רמת סוכר - כולל אינסולין - בבוקר הבדיקה.

ביצוע הבדיקה

- בהגיעך תתקבל על ידי אחות שתבצע זיהוי שלך בעזרת תג הזיהוי המוצמד ליד שלך והפרטים המופיעים בתיקך הרפואי. האחות תשאל אותך שאלות בנוגע לבריאותך ותתקין לך עירוי לווריד.
- רופא ריאות יסביר לך על פרטי הבדיקה והטשטוש ותתבקש לחתום על טפסי ההסכמה.
- תתבקש ללבוש חלוק ולשכב על הגב על גבי מיטה ייעודית.
- תחובר למוניטור על מנת לעקוב אחר רווית החמצן בדם, לחץ הדם והדופק.
- לפני החדרת הצינור תקבל לווריד תרופת טשטוש על מנת שתישן בזמן הבדיקה.
- תקבל תרסיס מאלחש נוגד כאב (לידוקאין) באינהלציה ובהתזה לגרון וגם על מנת למנוע שיעול ולדכא רפלקס הקאה המתעורר עם הכנסת הצינור.
- משך הבדיקה הינו בין 30 - 90 דקות.
- המלווה יישאר בצדך עד תחילת הבדיקה וימתין מחוץ לחדר עד סיומה. בהמשך ישהה בצדך בהתאוששות.

בסיום הבדיקה

- תועבר להתאוששות למשך כשעתיים להשגחה.
- לאחר שעתיים, ובאישור האחות המטפלת, תוכל לשתות ולאכול.
- בהתאם לסוג הבדיקה יתכן ותתבקש לבצע צילום חזה במכון הרנטגן.
- לאחר התאוששות מלאה תקבל מכתב שחרור הכולל סיכום של מהלך הבדיקה והנחיות להמשך טיפול ומעקב. תשוחרר לביתך עם מלווה.

לאחר השחרור

- עלייך לקבוע תור לרופא בהתאם להנחיה במכתב השחרור
- הנהיגה אסורה במהלך 12 שעות שלאחר הבדיקה בעקבות השפעה אפשרית של תרופת הטשטוש שקיבלת.
- שבועיים לאחר הבדיקה עלייך לבדוק עם הרופא המטפל אם הגיעו תשובות סופיות.

<p>התופעות הבאות דורשות פניה טיפול רפואי / חדר מיון (מומלץ להגיע עם מכתב שחרור):</p> <ul style="list-style-type: none"> ← קוצר נשימה הולך ומחמיר ← כאבים בחזה ← דימום 	<p>התופעות הבאות עלולות להופיע אך אינן דורשות טיפול:</p> <ul style="list-style-type: none"> ← צרידות וכאב גרון 24-48 שעות ← שיעול לעיתים עם ליחה דמית ← חום עד 38 מעלות
--	--

בבריאות שלמה ונשימה נינוחה

צוות מכון הריאות

טלפון להתייעצות 026555676