



כאב בקדמת האגן, המוחמר בהליכה ושינוי תנוחה, המאובחן כסימפיזיוליזיס (symphysiolisis), היא תופעה המופיעה לעיתים שכיחות בנשים בשליש השני והשלישי של ההיריון. סימפיזיוליזיס פוגעת קשות באיכות החיים של הנשים; הן מתקשות בתנועה, בהליכה, ישיבה, הרמת הגפיים התחתונות וכד'. בחלק ניכר מהנשים, הכאבים, ההגבלה בתנועה ואי הנוחות, בדרגות שונות, נמשכים במהלך ההיריון ועד כשנתיים אחריו. בימים אלה מתקיים באגף נשים ויולדות במרכז הרפואי שערי צדק, ניסוי קליני הבודק את יעילות הטיפול בתופעה זו בעזרת דיקור סיני. הניסוי מתקיים לאחר ניסיון חיובי שהצטבר אצל מטפלים ומטופלות כאחד בשנתיים האחרונות. הניסיון כלל עשרות נשים שסבלו מתופעה זו.

בניסוי תחולקנה הנשים המשתתפות, לשתי קבוצות: האחת שתטופל בדיקור סיני והשנייה- קבוצת ביקורת, שתטופל בדיקור אינבו (placebo). מאחר וההשפעה החיובית של הדיקור צפויה להיות מידית, תטופלנה הנשים שלא יגיבו לטיפול בשל היותן בקבוצת הביקורת, כשעה לאחר מכן, בדיקור "אמיתי", כך שבסופו של דבר, כל משתתפת בניסוי תטופל בדיקור הסיני "האמיתי". ניסוי זה עבר כמקובל ביקורת ואישור ועדת האתיקה של בית החולים שערי צדק.

**אנו מזמינים את הנשים המעוניינות להשתתף בניסוי להתקשר לעוז לוי 054-2211994**

**או באמצעות דוא"ל ([ozlevy@szmc.org.il](mailto:ozlevy@szmc.org.il))**