



הנחיות להורים לאחר טיפול בילד שעבר פעולה תחת סדציה (טשטוש, הרגעה)

הורים יקרים,

ילדכם עבר פעולה תחת סדציה .

אנחנו כאן כדי לענות על כל שאלותיכם.

חשוב שתדעו

- ❖ התאוששות מלאה שונה מילד לילד והיא תלויה בקצב פינוי התרופות מהגוף.
- ❖ יתכן שיתלונן על כאב ראש קל, סחרחורת, בחילה ולעיתים אפילו הקאות.
- ❖ לעיתים נדירות נצפית תופעה של אי שקט קיצוני החולפת מעצמה עם תום השפעת התרופה.
- ❖ עם התעוררות הילד ניתן לתת לו לשתות מים בלבד. מאוחר יותר לאחר התייעצות עם הצוות ניתן לתת לו לאכול.
- ❖ שחרור יתאפשר רק כאשר ילדכם ער לגמרי, חזר לעצמו בהרגשה הכללית ובהתנהגותו, הולך יציב, שותה ולא מקיא.
- ❖ שחרור מהמרכז הרפואי מותנה בבדיקה חוזרת של רופא ילדים / מרדים.

לאחר השחרור

- ❖ על אף שתתכן השפעה קלה מאוד של תרופות, ילדכם חזר להתנהג כמעט כרגיל ולכן שוחרר. למרות זאת הוא עדיין יכול להיות פחות מודע לגירויי סביבה. רצוי שב-24 השעות לאחר שחרורו מהמרכז הרפואי לא ילך לגן או לבית הספר, אלא ישהה במחיצת מבוגר אחראי.
- ❖ בשעות הראשונות לאחר השחרור אין להשאיר את הילד לבדו.
- ❖ עודדו את ילדכם לשתות ולאכול כרגיל, אך אל תכריחו אותו.

במקרים הבאים יש לפנות לעזרה רפואית

- ❖ הקאות מרובות (ארבע - חמש פעמים) וסירוב לשתות
- ❖ ישנוניות וקושי בהתעוררות
- ❖ אי שקט ניכר
- ❖ קוצר נשימה
- ❖ תופעות חריגות אחרות (חום גבוה, כאב לא ברור...)

בכל שאלה ניתן להתקשר למיון ילדים 02-6555781

בברכת רפואה שלימה
צוות אגף ילדים שערי צדק