

מידע למטופל

שטיפות שלפוחית השתן בתכשיר BCG

המידע מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומכוון לנשים וגברים כאחד

מטופל יקר,

הנך עומד לעבור סדרת שטיפות שלפוחית השתן בתכשיר BCG. אננו מקווים כי המידע שלפניך יעזור לך להגיע מוכן ורגוע לטיפולים.

מהו תכשיר BCG?

BCG הינה תמיסה המכילה חיידק מוחלש של שחפת בקר הנקרא *Bacillus Calmette-Guerin*. במקור שימש התכשיר כחיסון למחלת השחפת, בהמשך עם התפתחות מחקרית נמצא החיסון יעיל גם לטיפול בחלק מהגידולים בשלפוחית השתן. התכשיר מהווה טיפול המעורר את מערכת החיסון להשמדת תאים סרטניים בשלפוחית השתן. הטיפול אינו מתאים למי שנוטל תרופות המשפיעות על מערכת החיסון או סטרואידים. הטיפול מיועד לגידול שטחי ולא לכזה שחדר לשריר ומטרתו להקטין את הסיכון להתקדמות הגידול וחזרתו. הטיפול מתוכנן לתקופה של שנה עד שלוש שנים. הסדרה הראשונה מתבצעת אחת לשבוע במשך שישה שבועות. חודש לאחר מכן תוזמן לבדיקות לצורך הערכת יעילות הטיפול: ציסטוסקופיה ושתן לציטולוגיה. המשך הטיפול יקבע לפי החלטת הרופא ובהתאם לתוצאות הבדיקות.

בית לפני הטיפול:

1. בבוקר הטיפול מותר לאכול. רצוי לא לשתות נוזלים (במיוחד משקאות המכילים קופאין).
2. אם הנך נוטל תרופות משתנות – אין ליטול אותן בבוקר הטיפול אלא שעתיים לאחריו.
3. שתיה מרובה ומשתנים יגרמו למיהול התכשיר וידרוש השתנה וריקון השלפוחית בטרם עת.

במרפאה לפני הטיפול:

בבואך למרפאה, לאחר הרישום במזכירות המכון האורולוגי, תתקבל ע"י האחות. תישאל מספר שאלות: חשוב לדווח אם יש דימום בשתן, חום או זיהום. תתבקש לגשת לשירותים לרוקן את השלפוחית, לאחר מכן תוכנס לחדר הטיפולים. תתבקש להתפשט מבגדיך התחתונים וללבוש חלוק. הטיפול מתבצע בעודך שוכב על מיטת הטיפולים. לאחר חיטוי האזור, צנתר (קטטר) יוכנס לשלפוחית השתן דרכו תוחדר התרופה. לא תחוש בהחדרת התרופה. הטיפול נמשך דקות ספורות ובסיומו יוצא הצנתר. השתדל להימנע מלהטיל שתן למשך שעה וחצי עד שעתיים. על מנת שהתרופה תבוא במגע עם דפנות שלפוחית השתן למשך הזמן הנדרש.

התרוקנות לאחר הטיפול:

1. יש להקפיד לא להשאיר את התמיסה בשלפוחית יותר משעתיים.
2. לאחר התרוקנות ראשונה יש להגדיל את כמות השתייה כדי לשטוף את השלפוחית.
3. במשך שש השעות הראשונות לאחר תום הטיפול יש לחטא את השירותים לאחר הורדת המים באקונומיקה ולהשאיר את חומר החיטוי 15 דקות (נועד להפחית את הסיכון לחשיפת אנשים אחרים ל-BCG).
4. במשך שש שעות לאחר הטיפול מומלץ להתרוקן בשירותים בישיבה על מנת למנוע מגע של התרופה באזורים אחרים בגוף. אם נוצר מגע שכזה, יש לשטוף במים את האזור ואת הבגדים.
5. על מנת למנוע זיהומים יש לרחוץ היטב ידיים בסבון לאחר ההתרוקנות.

הנחיות כלליות:

1. במשך שבועה ימים לאחר הטיפול, מומלץ לקיים יחסי מין עם קונדום בלבד.
 2. לנשים מומלץ לא להרות משך כל תקופת הטיפול.
- תופעות לוואי אפשריות לרוב 24 - 48 שעות לאחר הטיפול:**
1. תכיפות/דחיפות/צריבה במתן שתן.
 2. דימום קל בשתן.
 3. ביום הטיפול יתכן חום, אי נוחות, עייפות וחולשה הדומים לסימני שפעת. ניתן לקחת כדור להורדת חום..
 4. כאבי פרקים, בחילות, הקאות, כאבי ראש, סחרחורת שיעול פריחה.
 5. חשוב ליידע את הצוות המטפל במקרים של צריבה ממושכת, עצירת שתן, כאבי מפרקים, שיעול, אדמדם בעור בחילות והקאות. צור עמנו קשר בשעות הפעילות.

אנחנו כאן בשבילך

026555630 בין השעות 08.00 - 15.00

בברכת רפואה שלמה והחלמה מהירה

צוות המכון האורולוגי

במקרים הבאים יש לפנות לחדר מיון:

• דימום משמעותי ו/או מתגבר

• חום גוף מעל 38.5

• צמרמורות