

הדרכה למטופל לאחר הוצאת צנתר קבוע משלפוחית השתן ('קטטר')

הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד

מטופל יקר,

צנתר קבוע לשלפוחית השתן מותקן מסיבות שונות, לרוב בעקבות עצירת שתן. לאחר תקופה בה ניקוז השתן נעשה בעזרת צנתר, ולאחר ניסיון גמילה מהשימוש בצנתר, החליט הרופא כי ניתן להוציאו ולאפשר לך להטיל שתן באופן עצמוני. לאחר הוצאת הצנתר על ידי האחיות, היא תוודא כי אינך מתקשה בהטלת שתן. במהלך הימים הקרובים חשוב לשים לב כי אכן אינך חוזר להרגיש קושי בהטלת שתן.

צריכה או תכיפות בהטלת השתן, עשויות להתפתח בימים הקרובים:

- המשך ליטול אנטיביוטיקה כפי שהונחית במכתב השחרור / סיכום ביקור.
- המשך ליטול התרופות הנוספות (כגון: קסטל – Xatral, אומניק – Omnic, דאודרט – Duodart) בהתאם להנחיות במכתב השחרור ו/או הנחיות מהאורולוג. (תרופות אילו נקראות 'חוסמי אלפא' ומיועדות לשפר את זרימת השתן).
- הקפד לשתות במהלך היום.
- ברר את תוצאות תרביית השתן שנלקחה לך לפני השחרור, בפקס מספר 02-6666823, או בטלפון 02-6555123.
- המשך מעקב של רופא אורולוג.
- ניתן לקחת משככי כאבים לפי צורך (כגון: אקמול – Acamol, אופטלגין – Optalgin, וולטרן – Voltaren) אם לא ידועה רגישות לתרופות אלו.

שים לב

אם מופיעות אחת או יותר מהתופעות הבאות:

- חום גוף מעל 38°C
- קושי מתגבר / מתמשך בהטלת שתן
- עצירת שתן מוחלטת

יש לפנות לעזרה רפואית (קופ"ח, מוקד רפואה דחופה, חדר מיון)

צוות המכון האורולוגי מאחל לך איכות חיים טובה, בריאות שלימה
וישמח לענות על כל שאלה בטלפון מספר 02-6555630, 02-6666468
בימי א-ה בין השעות 8:00-15:30