



מידע למטופל

שטיפות שלפוחית השתן בתכשיר MITOMYCIN C

המידע מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומכוון לנשים וגברים כאחד

מטופל יקר,

הינך עומד להיות מטופל בסדרת טיפולים ע"י שטיפות לתוך שלפוחית השתן בתכשיר MITOMYCIN C. אנו מקווים כי המידע שלפניך יעזור לך להגיע מוכן ורגוע לטיפולים.

רקע:

מיטומיצין C הינה תרופה כימותרפית ההורגת תאי גידול על ידי מגע עם הדפנות הפנימיות של כיס השתן. היא יעילה לטיפול בחלק מהגידולים, במיוחד במניעת חזרתם. התרופה ניתנת לטיפול בגידולים הנוטים לחזור, לטיפול בגידול מסוג CIS, במצבים בהם יש שארית גידול שלא ניתן לכווץ או למטופלים שלא יכולים לקבל ONCOTICE- B.C.G (תכשיר ששימש בעבר לחיסון נגד מחלת השחפת והיום ניתן בשטיפה לכיס השתן נגד גידולים סרטניים). סיבוך נדיר של הטיפול הינו התנקבות של כיס השתן או של השופכה.

טרם הפעולה:

לפני השטיפה הראשונה יש לבצע תרבית שתן בקופת חולים. אם התקבלה תשובה שלילית, כלומר אין צמיחת חיידקים, ניתן יהיה לבצע את השטיפה. **בבוקר הטיפול:** אפשר לאכול. רצוי לא לשתות (במיוחד משקאות המכילים קפאין). אין לקחת תרופות משתנות טרם השטיפה, ניתן לקחתם שעתיים לאחר הטיפול וזאת בכדי להחזיק את התרופה בכיס השתן. שתיה מרובה ומשתנים יגרמו למילוי מהיר של כיס השתן, דבר אשר יגרום למיהול התרופה, ידרוש השתנה וריקון כיס השתן בטרם עת.

מהלך הפעולה:

בהגיעך למרפאה יש להירשם במזכירות. בטרם הכניסה לחדר הטיפולים יש לרוקן את השלפוחית. לצורך השטיפה, יוכנס צנתר דרך השופכה לכיס השתן, דרכו מבוצע הטיפול. לאחר ההזרקה הצנתר יוצא.

שחרור לאחר הפעולה:

שחרור מהמכון מתבצע לאחר הוצאת הצנתר. אין צורך בליווי. יש להימנע (עד כמה שניתן) מלהטיל שתן למשך שעה וחצי עד שעתיים לאחר השטיפה (על מנת שהתרופה תבוא במגע עם דפנות כיס השתן למשך זמן מספק). יש להימנע מקיום יחסי מין ביום הטיפול. יש להשתמש בקונדום בעת קיום יחסי מין תוך 48 שעות מביצוע שטיפה. מומלץ לא להרות משך כל תקופת הטיפול. סדרת טיפולים נמשכת שישה עד שמונה שבועות - שטיפה אחת לשבוע. לאחר סדרה ראשונה יש לבצע ציסטוסקופיה. המשך הטיפול יקבע ע"י הרופא בהתאם לתוצאות הבדיקה.

התרונות לאחר שטיפה:

- ✚ שעתיים לאחר שטיפה יש להטיל שתן ולאחר מכן יש להגדיל את כמות השתייה על מנת לשטוף את השלפוחית. יש להקפיד לא להשאיר את התמיסה בשלפוחית מעבר לשעתיים.
- ✚ מומלץ להתרוקן בשירותים בשיבה.
- ✚ במשך שש השעות הראשונות לאחר השטיפה יש לשטוף את השירותים עם מים וסבון לאחר כל התרוקנות.
- ✚ לאחר כל מתן שתן באסלה, יש להדיח את המים פעמיים עם מכסה סגור למשך 72 שעות.
- ✚ במקרה של מגע שתן בעור יש לשטוף את האזור קודם עם מים ולאחר מכן להוסיף סבון.
- ✚ על מנת להימנע מחשיפה לתרופה מומלץ לרחוץ ידיים היטב לאחר כל התרוקנות.

מצבים בהם יש להגיע למיון:

- ✚ צמרמורת
- ✚ חום מעל 38.2
- ✚ אצירת שתן
- ✚ דימום משמעותי

תופעות לוואי אפשריות בתקופת הטיפול:

- ✚ תכיפות/דחיפות/צריבה במתן שתן
- ✚ אצירת שתן
- ✚ דימום קל בשתן
- ✚ גרד או פריחה בעיקר בכפות הידיים

אנו כאן לכל שאלה 050-8685926 02-6555630 08:00 – 15:00
רפואה שלמה והחלמה מהירה - צוות המכון האורולוגי