



דף הסבר והוראות לנבדק

מיפוי לזיהוי Meckel's Diverticulum

מטרת הבדיקה: לאבחן נוכחות ומיקום רקמת קיבה במיקום חריג (למשל, דיברטיקול ע"ש מקל).

לאחר קבלה משרדית תוזמן ע"י טכנאי להיכנס למחלקה, ויוחדר לך עירוני תוך-וריד שישמש להזרקת חומר רדיואקטיבי. תיתכן אי נוחות קלה.

אם הנבדק הוא ילד/ה החדרת העירוני תבצע ע"י צוות מיומן לכך בבית החולים לילדים. לצורך זה לאחר קבלה משרדית תקבל מהמזכירה במחלקה דף הפניה לבי"ח-יום ילדים. כדי להקל על אי הנוחות בתהליך לעיתים יינתן חומר מרגיע על פי הנוהל בבית החולים לילדים.

לאחר השחרור מבית החולים לילדים עליך לחזור למחלקה לרפואה גרעינית ולהודיע על חזרתך במשרד הקבלה. אז תוזמן ע"י טכנאי להיכנס למחלקה להזרקת החומר הרדיואקטיבי והמשך תהליך הבדיקה. בדרך כלל אין תופעות לוואי להזרקת.

החומר הרדיואקטיבי מוזרק על מיטת המצלמה. ניתן לאפשר נוכחות מלווה אחד בחדר הצילומים. עליך לשכב על הגב בצורה נוחה ללא תזוזה ככל הניתן.

עליך להסיר אביזרים מתכתיים בלבד.

המצלמה סורקת את גופך ומאתרת את פיזור החומר הרדיואקטיבי בגוף, בעיקר באזור הבטן והאגן. המצלמה מתקרבת מאוד לגוף אך לא נוגעת בו.

הצילומים נמשכים לסירוגין כשעה.

בסיום הבדיקה תמתין לקבלת דיסק עם צילומי הבדיקה, ואז תוכל לצאת מהמחלקה.

אם הנבדק הוא ילד קטן, לעיתים בסיום הצילומים ולאחר קבלת הדיסק, הנבדק יקבל דף הפניה לבי"ח יום ילדים לצורך הוצאת צינורית העירוני. לאחר פעולה זו הנבדק משוחרר לביתו.

הוראות לנבדק לפני הבדיקה:

1. נדרש צום של 4 שעות.

הוראות לנבדק לאחר הבדיקה:

1. בסיום הצילומים תישאר בגופך כמות קטנה של חומר רדיואקטיבי, שלא מהווה סכנה לך או לסובבים אותך. עם זאת, מומלץ להרבות בשתייה במהלך אותו יום.
2. אין להניק למשך 24 שעות לאחר ההזרקת.
3. יש לשמור מרחק מילדים ונשים הרות למשך 5 שעות מרגע ההזרקת.
4. ניתן לשאוב חלב בפרק זמן זה. את החלב יש לשמור במקרר\ הקפאה ולהשתמש לאחר 24 שעות מרגע ההזרקת -לאחר דעיכת החומר הרדיואקטיבי.

בברכת רפואה שלמה

צוות המחלקה לרפואה גרעינית

