



פרטי מטופל / מדבקה

הכנה לקלונוסקופיה בעזרת מוביפרפ (MOVIPREP)

הכנה תזונתית: אסור לאכול: פירות וירקות (טריים או מבושלים), דגנים (לחם מלא, לחם דגנים, כוסמת, שיבולת שועל ועוד) קטניות (אפונה, שעועית, עדשים אורז וכד'), פיצוחים (גרעינים, שקדים, בוטנים, שומשום וכד') ובשר בקר. מוותר לאכול: מוצרי קמח לבן (פיתה, לחמניה, לחם לבן, פסטה, קרקרים, אטריות וכד'), ביצים, דגים, עוף, הודו, מרק צה ללא ירקות, מוצרי חלב ללא חתיכות פרי	3 ימים לפני הבדיקה ___/___/___
הכנה תזונתית: יש להמשיך באותה דיאטה כמו ביום הקודם.	יומיים לפני הבדיקה ___/___/___
הכנה תזונתית: יש להפסיק לאכול מהשעה 10:00. מותרת שתיית נוזלים צלולים: מים ותה ממותקים, מיצי פירות מסוננים, מרק צה וג'לי. אסור חלב וקפה שחור.	יום לפני הבדיקה ___/___/___
הכנה תרופתית: 10-14 שעות לפני הבדיקה יש להתחיל לשתות את המוביפרפ (MOVIPREP) באופן הבא: (ראה איור למטה) יש לערבב היטב את תוכן 2 שקיות (הנמצאות בתוך שקית 1) בתוך 1 ליטר מים ולערבב עד להמסה (יכול לקחת מס' דקות). יש לשתות כל 10-15 דקות כוס מוביפרפ ולסיים לכל היותר תוך שעתיים את הכמות כולה. מומלץ לשתות בנוסף על חצי ליטר או יותר של מים/נוזלים צלולים.	___/___/___
הכנה תזונתית: מותרת שתית מים ונוזלים צלולים עד 3 שעות לפני הבדיקה. לאחר מכן יש לשמור על צום מוחלט. אם הבדיקה מבוצעת בהרדמה מלאה יש לשמור על צום מוחלט 4 שעות.	יום הבדיקה ___/___/___
הכנה תרופתית: 4-5 שעות לפני הבדיקה יש לשתות ליטר נוסף של מוביפרפ. הכנת הליטר השני זהה להכנת הליטר הראשון (בעזרת 2 השקיות שבשקית 2). יש לסיים את שתיית החומר עד שעתיים לפני הבדיקה. אם הבדיקה מבוצעת בהרדמה מלאה יש לסיים את שתיית החומר עד 4 שעות לפני הבדיקה	___/___/___

הכנת תמיסת מוביפרפ לשתיה:

המארז מכיל 2 שקיות שקופות שכל אחת מהן מכילה זוג שקיקים: שקיק 1 ושקיק 2. יש להמיס במים כל זוג שקיקים (1+2) כדי להכין ליטר 1 של תמיסה. המארז מספיק להכנת 2 ליטרים של תמיסת מוביפרפ.

טיפים לשתיה קלה:

לשמור את התמיסה בקירור לפחות 1/2 שעה לפני השימוש לשיפור הטעם. לשתות את המוביפרפ עם קש להקלת השתייה. לשים בפה קוביית קרח לדקה או שתיים לפני ששותים

