



דף הסבר והוראות לנבדק

לימפומינטינוגרפיה - ממאירות

מטרת הבדיקה: זיהוי בלוטות לימפה המנקזות תהליך ממאיר לפני ניתוח.
לאחר קבלה משרדית תוזמן ע"י טכנאי להיכנס למחלקה.

במחלקה יוזרקו סביב הנגע (למשל בשד או בעור) ארבע מוקדים של חומר רדיואקטיבי. במהלך ההזרקה תחוש כאב. במידת האפשר החומר יוזרק תחת אלחוש מקומי עם לידוקאין. בדרך כלל אין תופעות לוואי להזרקה. יש לוודא שהנבדק לא אלרגי ללידוקאין. ניתן לאפשר נוכחות מלווה אחד בחדר ההזרקה.

במקרה של הזרקה סביב נגעים בעור:

ההזרקה מתבצעת בדרך כלל על מיטת המצלמה. לאחר ההזרקה של החומר הרדיואקטיבי מתבצעת סריקה מיידיית למשך כ- 10-20 דקות בה עליך לשכב על הגב ללא תזוזה. לעיתים תתבצע סריקה נוספת במצלמת SPECT/CT. לעיתים יתבצעו צילומים נוספים בשלבים מאוחרים יותר כשעה ואף יותר לאחר ההזרקה.

במקרה של הזרקה סביב נגע בשד:

לאחר ההזרקה של החומר הרדיואקטיבי תתבקש לחזור לסריקה שתתבצע כ- 60 דקות לאחר ההזרקה. משך הסריקה הינו כ- 10-30 דקות, בהן עליך לשכב על הגב ללא תזוזה על פי הוראות הטכנאי. לעיתים תתבצע סריקה נוספת במצלמת SPECT/CT. לעיתים יתבצעו צילומים נוספים בשלבים מאוחרים יותר כשעה ואף יותר לאחר ההזרקה.

הצילומים יתבצעו בחדר המצלמה המיועד לכך. ניתן לאפשר נוכחות מלווה אחד בחדר הצילומים. עליך לשכב על הגב בצורה נוחה ללא תזוזה.

המצלמה סורקת את גופך ומאתרת את פיזור החומר הרדיואקטיבי בשלד. המצלמה מתקרבת מאוד לגוף אך לא נוגעת בו.

הוראות לנבדק לפני הבדיקה:

1. על הנבדקת לדווח לצוות המחלקה אם היא בהריון או מניקה.

2. יש להפסיק הנקה 3 שעות לפני הסריקה.

הוראות לנבדק לאחר הבדיקה:

1. בסיום הצילומים תישאר בגופך כמות קטנה של חומר רדיואקטיבי, שלא מהווה סכנה לך או לסובבים אותך. עם זאת, מומלץ להרבות בשתייה במהלך אותו יום.

2. יש להימנע ממגע הדוק וממושך עם ילדים ועם נשים הרות למשך 1 שעה מההזרקה.

3. יש להפסיק הנקה למשך 3 שעות לאחר ההזרקה. ניתן לשאוב חלב במשך זמן זה ולהאכיל ע"י אדם אחר.

בברכת רפואה שלמה

צוות המחלקה לרפואה גרעינית

