



הנחיות לשימוש בטיפות עיניים לאחר טיפול ברפרקציה

LASIK

ההנחיות מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומכוונות לנשים וגברים כאחד

מטופל יקר,

עברת טיפול ברפרקציה.

על מנת לשמור על תוצאות מיטביות חשוב שתקפיד על הטיפול התרופתי המפורט.

- ✓ יש להשתמש בטיפות לפי הסדר הרשום
- ✓ יש לטפטף את הטיפות רק במהלך היום
- ✓ יש לאחסן את בקבוק הטיפות במקרר לאחר פתיחתו
- ✓ אין להשתמש באותו הבקבוק מעל חודש ימים
- ✓ יש לרחוץ ידיים לפני טפטוף הטיפות
- ✓ יש להטות את הראש לאחור (אפשר בישיבה או בשכיבה)
- ✓ יש להרחיק מעט את העפעף התחתון מהעיין בעזרת האצבע ולטפטף את הטיפה לתוך "שקית" העין שנוצרה
- ✓ יש להקפיד שהבקבוק לא יגע בעין

טיפות לאחר- LASIK- Laser-assisted in situ keratomileusis

שם התרופה	שבוע ראשון	עד הביקורת – חודש לאחר הטיפול
1 סטרוודקס STERODEX EXAMETHASONE	4 פעמים ביום טיפה בכל עין	X
2 ויגמוקס VIGAMOX MOXYFLOXACIN	4 פעמים ביום טיפה בכל עין	X
3 סיסטיין SYSTANE דמעות מלאכותיות	6 פעמים ביום טיפה בכל עין ניתן להשתמש יותר	4 פעמים ביום טיפה בכל עין ניתן להשתמש יותר

ניתן לצפות בהנחיות גם בקישור הבא :

<http://fyi.rendia.com/37pYp>

