

מידע למטופל

ביופסיית כבד

המידע מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומכוון לנשים וגברים כאחד

מטופל יקר,

הגעת היום בכדי לבצע ביופסיית כבד (liver biopsy). המידע שלפניך יעזור לך להיות מוכן יותר לקראת הבדיקה.

מהי ביופסיית כבד?

בדיקה אבחנתית בה נוטלים דגימת רקמה לצורך בדיקה וקביעת אבחנה. הבדיקה מתבצעת במכון הדימות (רנטגן) בהנחיית אמצעי הדמיה (אולטרה-סאונד או CT) על מנת להגיע במדויק לרקמה אשר ממנה צריך לקחת דגימה.

הכנה לבדיקה:

- ❖ עליך להיות בצום במשך 6 שעות לפני הבדיקה
- ❖ באם הנך נוטל תרופות לדילול דם כמו CLEXANE, COUMADIN, ASPIRIN, PLAVIX וכו' יש להפסיק ליטול אותן לפני הבדיקה בהתאם להנחיות הרופא המטפל
- ❖ יש להגיע עם תוצאות עדכניות של בדיקות דם: ספירת דם, תפקודי קרישה ומכתב מרופא המטפל שכולל רשימת מחלות, תרופות ורגישויות, צילומים קודמים (דיסקים מקוריים)
- ❖ יש להביא התחייבות מקופת חולים (קוד: C999C או C5011)
- ❖ חובה להגיע לבדיקה עם מלווה!

מהלך הבדיקה:

- ❖ משך הבדיקה כולל ההכנות הינו כ- 20 דקות
- ❖ הבדיקה מתבצעת בתנאים סטריליים
- ❖ לקיחת הדגימה מתבצעת בהרדמה מקומית וטשטוש לפי הצורך
- ❖ בסיום הבדיקה אזור הבדיקה נחבש עם חבישה לוחצת, עליך להסיר את החבישה ביום הבא

לאחר הבדיקה:

- ❖ בסיום הבדיקה, יש לשכב על הגב עם הטיה לצד ימין במשך שעתיים, ולאחר מכן אפשר לרדת מהמיטה באופן הדרגתי, בהשגחת אחות
- ❖ האחות תמדוד לחץ דם ודופק וכן תבדוק את אזור הבדיקה
- ❖ אכילה ושתייה מותרים לאחר שעתיים מסיום הבדיקה
- ❖ במידה ויש כאבים, ניתן לבקש מהאחות משככי כאבים
- ❖ כשעתיים לאחר הבדיקה נלקחת בדיקת דם
- ❖ שחרור יתקיים לא לפני 5 שעות מסיום הפרוצדורה

לאחר שחרור:

- ❖ מומלץ לנוח ולהימנע מפעילות גופנית מאומצת במשך יומיים לאחר הבדיקה
- ❖ יש להתרחץ במים פושרים במשך יומיים לאחר הבדיקה
- ❖ במידה ומתחיל כאב לאחר השחרור ניתן ליטול תרופות נגד כאבים (אקמול, אופטלגין וכו')
- ❖ במידה ויופיעו כאבי בטן, חולשה, חום מעל 38 מעלות, יש לפנות לחדר מיון עם מכתב שחרור
- ❖ יש לחזור ליטול תרופות לדילול דם לאחר התייעצות עם רופא המטפל
- ❖ חשוב להימנע מנהיגה באותו יום לאחר הבדיקה
- ❖ לבירור תוצאות הביופסיה יש לפנות לרופא המפנה כ-3 שבועות לאחר הבדיקה