



דף הסבר והוראות לנבדק

מיפוי בלוטת התריס (עם טכנציום)

מטרת הבדיקה: הדגמה של מיקום ותפקוד בלוטת התריס.
לאחר קבלה משרדית תוזמן ע"י טכנאי להיכנס למחלקה.
בקבלתך במחלקה תענה על שאלון כדי לברר שמילאת את הוראות ההכנה לבדיקה.
במחלקה יוחדר לך עירוני תוך-וריד שישמש להזרקת חומר רדיואקטיבי. תיתכן אי נוחות קלה. הצינורית תוצא לאחר ההזרקה.
לרוב אין תופעות לוואי להזרקה.
לאחר כ- 20 דקות מההזרקה של החומר הרדיואקטיבי תתבקש לשותות מים (כדי לשטוף את החומר המופרש ברוק) ותוזמן לחדר המצלמה. שם תתבקש לשכב על הגב על מיטת המצלמה, בצורה נוחה ללא תזוזה.
עליך להסיר אביזרים מתכתיים.
ניתן לאפשר נוכחות מלווה אחד בחדר הצילומים.
המצלמה סורקת את אזור הצוואר במשך כ- 10-30 דקות. המצלמה מתקרבת מאוד לגוף אך לא נוגעת בו.
בסיום הבדיקה תמתין לקבלת דיסק עם צילומי הבדיקה, ואז תוכל לצאת מהמחלקה.

הוראות לנבדק לפני הבדיקה:

1. על הנבדקת לוודא שהיא לא בהריון.
2. על הנבדקת לדווח לצוות המחלקה אם היא מניקה.
3. **בתיאום עם הרופא המפנה** יש להפסיק טיפול בתרופות אנטי-טירואידיות כגון: מתמזול (טאפאזול) ופרופיל-תיואורציל (PTU) למשך שבוע.
- כמו כן, יש להפסיק טיפול בתירוקסין (אלתרוקסין) 4-6 שבועות לפני הבדיקה.
- יש להפסיק טיפול בציטומל 14 ימים לפני הבדיקה.
- יש להימנע מנטילת אמיודרון (פרוקור, PROKOR) 3-6 חודשים לפני הבדיקה.
4. אין לבצע בדיקה עם חומר ניגוד ורידי על בסיס יוד במשך 4-8 שבועות לפני הבדיקה (למשל: CT עם הזרקת חומר ניגוד תוך ורידי, בדיקת אנגיוגרפיה).
5. אין למרוח תמיסת חיטוי על בסיס יוד על העור עד 2-4 שבועות לפני הבדיקה (השימוש ביוד נעשה בזמן פציעה, בזמן ניתוח לאחרונה, או עקב שתיית תמיסה המכילה יוד - לוגול).





הוראות לנבדק לאחר הבדיקה:

1. בסיום הצילומים תישאר בגופך כמות קטנה של חומר רדיואקטיבי, שלא מהווה סכנה לך או לסובבים אותך. עם זאת, מומלץ להרבות בשתייה במהלך אותו יום.
2. יש לשמור מרחק מילדים ונשים הרות למשך 5 שעות מרגע ההזרקה.
3. אין להניק למשך 24 שעות לאחר ההזרקה. בפרק זמן זה ניתן לשאוב חלב. את החלב יש לשמור במקרר\ הקפאה ולהשתמש לאחר 24 שעות מרגע ההזרקה -לאחר דעיכת החומר הרדיואקטיבי.

בברכת רפואה שלמה

צוות המחלקה לרפואה גרעינית

