



הנחיות לשימוש בטיפות עיניים לאחר טיפול ברפרקציה PRK/PTK/CXL

ההנחיות מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומכוונות לנשים וגברים כאחד

מטופל יקר,

עברת טיפול ברפרקציה.

על מנת לשמור על תוצאות מיטביות חשוב שתקפיד על הטיפול התרופתי המפורט.

- ✓ יש להשתמש בטיפות לפי הסדר הרשום
- ✓ יש לטפטף את הטיפות רק במהלך היום
- ✓ יש לאחסן את בקבוק הטיפות במקרר לאחר פתיחתו
- ✓ אין להשתמש באותו הבקבוק מעל חודש ימים
- ✓ יש לרחוץ ידיים לפני טפטוף הטיפות
- ✓ יש להטות את הראש לאחור (אפשר בישיבה או בשכיבה)
- ✓ יש להרחיק מעט את העפעף התחתון מהעין בעזרת האצבע ולטפטף את הטיפה לתוך "שקית" העין שנוצרה
- ✓ יש להקפיד שהבקבוק לא יגע בעין

PRK - Photorefractive keratectomy טיפות לאחר -

PTK - Phototherapeutic keratectomy

CXL - Corneal cross linking

שם התרופה	שבוע ראשון	שבוע שני	שבוע שלישי	שבוע רביעי
1 סטרודקס STERODEX EXAMETHASONE	4 פעמים ביום טיפה בכל עין	3 פעמים ביום טיפה בכל עין	2 פעמים ביום בוקר וערב טיפה בכל עין	פעם 1 ביום טיפה בכל עין
2 ויגמוקס VIGAMOX MOXYFLOXACIN	4 פעמים ביום טיפה בכל עין	X	X	X
3 סיסטין SYSTANE דמעות מלאכותיות	6 פעמים ביום טיפה בכל עין ניתן להשתמש יותר	4 פעמים ביום טיפה בכל עין ניתן להשתמש יותר	4 פעמים ביום טיפה בכל עין ניתן להשתמש יותר	4 פעמים ביום טיפה בכל עין ניתן להשתמש יותר
לכאבים ניתן להשתמש (אם לא ידועה רגישות) באחת מהתרופות הבאות לפי צורך: 1000 mg Acamol (Paracetamol) כל 4-6 שעות 500 mg Optalgin (Dipyrone) כל 6 שעות				

ניתן לצפות בהנחיות גם בקישור הבא:

<http://fyi.rendia.com/QusnC>

