



דף הסבר והוראות לנבדק

מיפוי פאראטירואיד (יותרת בלוטת התריס)

מטרת הבדיקה: זיהוי ומיקום אדנומה של בלוטת הפאראטירואיד, בנוכחות פעילות יתר של בלוטת הפאראטירואיד.

לאחר קבלה משרדית תוזמן ע"י טכנאי להיכנס למחלקה, ויוחדר לך עירוני תוך-וריד שישמש להזרקת חומר רדיואקטיבי. תיתכן אי נוחות קלה. עירוני יוצא לאחר ההזרקה.

בדרך כלל אין תופעות לוואי להזרקת.

כחצי שעה לאחר ההזרקת של החומר הרדיואקטיבי תעבור סדרת צילומים ראשונה של אזור הצוואר ובית החזה. עליך לשכב על הגב בצורה נוחה ללא תזוזה למשך כ- 10 דקות. כעבור כשעה וחצי תעבור שתי סדרות צילומים נוספות כולל בדיקת SPECTCT, הנמשכות כ- 30 דקות.

ניתן לאפשר נוכחות מלווה אחד בחדר הצילומים.

המצלמה סורקת את גופך ומאתרת את פיזור החומר הרדיואקטיבי באזור הצוואר ובית החזה. המצלמה מתקרבת מאוד לגוף אך לא נוגעת בו.

בסיום הבדיקה תמתין לקבלת דיסק עם צילומי הבדיקה, ואז תוכל לצאת מהמחלקה.

לציין כי לעיתים תוצאות הבדיקה ידרשו השלמת בדיקה ע"י ביצוע מיפוי בלוטת התריס. מיפוי זה יתבצע בדרך כלל ביום אחר. מזכירות המחלקה תקבע בתיאום איתך תור למיפוי זה במחלקה לרפואה גרעינית.

הוראות לנבדק לפני הבדיקה:

על הנבדקת לדווח לצוות המחלקה אם היא בהריון או מניקה.

הוראות לנבדק לאחר הבדיקה:

1. בסיום הצילומים תישאר בגופך כמות קטנה של חומר רדיואקטיבי, שלא מהווה סכנה לך או לסובבים אותך. עם זאת, מומלץ להרבות בשתייה במהלך אותו יום.
2. יש להימנע ממגע הדוק וממושך עם ילדים ועם נשים הרות למשך 4 שעות מההזרקת.
3. אין להניק למשך 4 שעות מההזרקת.

בברכת רפואה שלמה

צוות המחלקה לרפואה גרעינית

