

מידע למטופל

טיפות להרחבת אישונים

המידע מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומכוון לנשים וגברים כאחד

מטופל יקר,

על מנת לבצע את הבדיקה אליה הוזמנת, יש צורך בהרחבת האישונים. הרחבת האישונים נעשית בעזרת טיפות המכילות ציקלופנטולט 1% (Cyclopentolate), ממשפחת האטרופין (Atropine).

רקע

האישון הוא העיגול המצוי במרכז קשתית העין. פעילות האישון דומה לזו של צמצם מצלמה. האישון משנה את גודלו בתנאי תאורה שונים ובכך משנה את כמות האור החודרת לעין. הרחבת האישונים גורמת לשיתוק זמני של השריר המשנה את צורת העדשה הפנימית של העין ומאפשרת לראות בצורה מדויקת את הרשתית ואת עצב הראייה. כך ניתן לשלול/ לאבחן תופעות בעיניים הקשורות בגיל ובמחלות כרוניות (כמו סוכרת ויתר לחץ דם), קרעים ברשתית ו/או הפרדות של הרשתית.

בילדים - הצורך בהרחבת האישונים חשוב על מנת לקבוע את הצורך במשקפים ומספרם המדויק. לא כל בדיקת עיניים מחייבת הרחבת האישונים, הדבר נתון לשיקול דעת הרופא, בהתאם לסוג הבדיקה ומצבך הרפואי.

חשוב לדעת: השימוש בטיפות בטוח מאוד ונדירים הדיווחים על תופעות לוואי. למרות זאת, אם ידועה לך רגישות לאטרופין (Atropine), אנא ידע את האחות/רופא **טרם** הזלפת הטיפות לעיניים.

לאחר הזלפת הטיפות דרושה המתנה של עשרים עד ארבעים דקות עד להרחבת האישונים במידה מספקת. אנא היאזר בסבלנות.



תסמינים מרכזיים

כל זמן שהאישונים מורחבים קיים טשטוש ראייה זמני: טשטוש הראייה יגרום לקושי בקריאה ו/או שימוש במסכים (מחשב, טלפון נייד וכדומה) לכשלוש עד שש שעות. השפעת הטיפות תמיד חולפת, על אף שלעיתים נדמה כי נמשכת זמן ארוך.

אסור לנהוג עד לחלוף השפעת הטיפות.

מומלץ להשתמש במשקפי שמש: הרחבת האישונים גורמת לסנוור.

בילדים האישון יישאר רחב לעיתים אפילו עד שלושה ימים.

אל דאגה: האישון יחזור למצבו הקודם ולא יגרם כל נזק כתוצאה מהרחבת האישון.