



דף הסבר והוראות לנבדק

מיפוי כדוריות אדומות (המנגיומה \ MUGA \ דימום מדרכי העיכול)

מטרת הבדיקה: הבדיקה מתבצעת למספר מטרות, בתלות בסיבה להפניה, כולל: זיהוי המנגיומות, זיהוי נוכחות ומיקום דימום מדרכי העיכול והערכת תפקוד חדר שמאל של הלב. לאחר קבלה משרדית תוזמן ע"י טכנאי להיכנס למחלקה.

בשלב ראשון יוזרק חומר הכנה לא-רדיואקטיבי ישירות לתוך הווריד. לעיתים רחוקות יתכן כאב קל. במחלקה גם תוחדר לך צינורית תוך-ורידית (עירו) לצורך הזרקת החומר הרדיואקטיבי. תיתכן אי נוחות קלה.

לאחר המתנה של כ- 20 דקות יוזרק לך חומר רדיואקטיבי דרך העירו. בדרך כלל אין תופעות לוואי להזרקת.

ההזרקת של החומר הרדיואקטיבי מתבצעת לעיתים מספר דקות לפני הצילומים, ולעיתים מתבצעת על מיטת המצלמה מיד לפני הצילומים ולשם כך תישאר עם העירו עד סיום הבדיקה.

לרוב אין תופעות לוואי להזרקת.

לצורך הצילומים עליך להסיר אביזרים מתכתיים.

הצילומים מתבצעים בחדר המצלמה המיועד לכך. עליך לשכב על הגב בצורה נוחה ללא תזוזה.

ניתן לאפשר נוכחות מלווה אחד בחדר הצילומים.

המצלמה סורקת את גופך ומאתרת את פיזור החומר הרדיואקטיבי בגוף. המצלמה מתקרבת מאוד לגוף אך לא נוגעת בו.

בבדיקה לזיהוי המנגיומה בכבד- לאחר סדרת צילומים ראשונה של כחצי שעה תרד מהמיטה. כעבור כשעתיים תוחזר לסדרת צילומים נוספת למשך כחצי שעה.

בבדיקה לזיהוי דימום ממערכת העיכול – הצילומים מתבצעים על מיטת הבדיקה ויכולים להימשך מספר שעות לסירוגין.

בבדיקת MUGA – הצילומים נמשכים כ- 15 דקות.

בסיום הבדיקה תמתין לקבלת דיסק עם צילומי הבדיקה, ואז תוכל לצאת מהמחלקה.

הוראות לנבדק לפני הבדיקה:

1. על הנבדקת לדווח לצוות המחלקה אם היא בהריון או מניקה.



הוראות לנבדק לאחר הבדיקה:

1. בסיום הצילומים תישאר בגופך כמות קטנה של חומר רדיואקטיבי, שלא מהווה סכנה לך או לסובבים אותך. עם זאת, מומלץ להרבות בשתייה במהלך אותו יום.
2. יש להימנע ממגע הדוק וממושך עם ילדים ועם נשים הרות למשך שעה 1 מההזרקה.
3. אין להניק למשך 12 שעות מזמן ההזרקה. ניתן לשאוב בפרק זמן זה. את החלב יש לשמור במקרר\ הקפאה ולהשתמש לאחר 24 שעות מרגע ההזרקה - לאחר דעיכת החומר הרדיואקטיבי.

בברכת רפואה שלמה

צוות המחלקה לרפואה גרעינית

