

הדרכה למטופל בגז קרבוגן (CARBOGEN)

הטופס מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד

מטופל יקר!

הטיפול בגז הקרבוגן מיועד לסובלים מירידה פתאומית בשמיעה.
הירידה בשמיעה עלולה להיגרם בשל היצרות כלי הדם הקטנים באוזן הפנימית (החלק האחראי על השמיעה).
הקרבוגן מכיל חמצן בריכוז 95% ופחמן דו חמצני בריכוז 5%.
הקרבוגן מרחיב את כלי הדם במוח ובאוזן הפנימית ובכך עשוי לשפר את השמיעה.
האחות במחלקה תדריך אותך בכל הקשור לשימוש בקרבוגן בעזרת משאף (אינהלציה).
האחות תסייע לך בכל פעם שתרגיש צורך בעזרה בביצוע האינהלציה.



חשוב מאוד!

**אסור לעשן בזמן הטיפול
ואין להשתמש בטלפון הנייד
בזמן השימוש בקרבוגן
בגלל סכנת התלקחות**



חשוב לדעת:

- האינהלציה מתבצעת 4 פעמים ביממה בכל פעם במשך 20 דקות. יש להקפיד על פיזור מועדי ביצוע האינהלציות על פני היממה כולה.
- מסכת המשאף הינה אישית. למסכה תוצמד מדבקה עם פרטיך ותאריך התחלת השימוש במסכה.
- יש לבצע את האינהלציה בישיבה וברגיעה.
- בעת הטיפול חשוב להשתדל לנשום בקצב אחיד.
- במידה ותחוש סחרחורת או בחילה, עליך לקרוא לאחות על ידי לחיצה על פעמון הקריאה.
- בסיום הטיפול יש להניח את המסכה בתוך הארונות ליד מיטתך.
- האחות במחלקה תוודא החלפת המסכה האישית פעם בשבוע.
- לעיתים יתכנו כאבי ראש ותחושת חום כתגובה לאינהלציות. במידה והתחושות מתמידות ומטרידות, אנא ידע את הצוות.

בברכת הצלחת הטיפול ורפואה שלמה!

צוות מחלקת אף אוזן גרון