

## תכנית טיפול: מיקרודוז Microdose

### מטופלת יקרה,

מטרת ההזרחה לספק לך מידע אשר יעזור לך לעבור את הטיפול בדרך הטובה והבטוחה ביותר.

### רקע:

העיקרון המרכזי של טיפול המיקרודוז (מינון מינימלי לדחיית הביוץ) בהפריה חוץ גופית הוא הוצאת הביצית מחוץ לגוף, הפרייתה במעבדה והחזרת העובר לחלל הרחם. לצורך יצירת מספר ביציות, יש צורך בטיפול תרופתי. מרכיב עקרוני נוסף של הטיפול הוא מניעת ביוץ מוקדם, שכן ביוץ לפני שאיבת הביציות מחוץ לגוף, ייגרם לכישלון בטיפול.

### תהליך הטיפול:

1. נטילת גלולות למניעת הריון למשך 21 יום (לא משנה איזה סוג).
2. יומיים לאחר סיום הגלולות עליך להגיע ליחידה בין השעות 7:00-9:00 ללקיחת בדיקות דם ולביצוע אולטרסאונד.
3. יומיים לאחר סיום חפיסת הגלולות, תתחילי טיפול בדקהפפטיל Decapeptyl במינון 0.05cc פעמיים ביום (בוקר וערב). תרופה זו ניתנת בזריקה תת עורית יומית למשך כ-12 ימים (ביום הביקור תקבלי ביחידה מזרק 1cc לדוגמא).
4. ביום השלישי לזריקות יש להוסיף עוד שתי זריקות המכילות הורמון FSH ולעיתים גם LH (סה"כ 4 זריקות ביום למשך כ-12 יום). שמות הזריקות האפשריות הן: גונל F Gonal, פיורגון Puregon, פרגובריס Pergoveris, מנוגון Menogon, מנופור Menopur, לובריס Luveres. שעות ההזרקה 16:00-22:00. הטיפול הוא כל יום למשך 8-12 יום.
5. על מנת להעריך את התגובה לטיפול ולקבוע את המינונים המתאימים לכל מטופלת, יש לבצע בדיקת דם ואולטרסאונד לעיתים תכופות: פעמיים בשבוע. שלב זה נמשך כשבועיים.
6. במהלך הטיפול תופני ע"י האחיות לאחד מרופאי היחידה לצורך בדיקת הכנה לקראת שאיבת הביציות וכן רופא מרדים במקרה הצורך. (נשים מעל גיל 40 חובה לבצע EKG)
7. ביום ביצוע בדיקת הדם והאולטרסאונד תקבלי מהיחידה הודעת SMS (מסרון) (ובמידת הצורך, גם טלפון/פקס), המודיע על כך שממתינות עבורך הנחיות באתר האינטרנט של היחידה, בימים א'-ה' בשעות: 13:00-15:00 וביום ו' בין השעות: 11:30-12:30.



8. יש לדווח לאחות על מועד יום הטבילה (אם זה חשוב לך).

9. זכרי, עליך להיות מצוידת בכל התרופות הנדרשות בהתאם למרשמים שניתנו לך ביום תחילת הטיפול.

**נשמח לעמוד לרשותך בימים א-ה בין השעות 12:00-14:00**

**וביום ו' בין השעות 11:00-12:30, בטלפון: 02-6666055**

**בכל ביקור במרפאת IVF יינתן אישור חניה – פרטים במזכירות היחידה**

**היחידה להפריה חוץ-גופית**