



דף הסבר והוראות לנבדק

מיפוי לב לעמילואידוזיס (פירופוספט, PYP)

מטרת הבדיקה: זיהוי מעורבות של שריר הלב בעמילואידוזיס.

לאחר קבלה משרדית תוזמן ע"י טכנאי להיכנס למחלקה, ויוחדר לך עירוני תוך-וריד שישמש להזרקת חומר רדיואקטיבי. תיתכן אי נוחות קלה. העירוני יוצא לאחר ההזרקת.

לרוב אין תופעות לוואי להזרקת.

לאחר ההזרקת של החומר הרדיואקטיבי תתבקש להמתין כשעה, במהלכה מומלץ לשתות נוזלים ולרוקן בתכיפות את שלפוחית השתן.

מספר דקות לפני תחילת הצילומים תתבקש לרוקן את שלפוחית השתן.

עליך להסיר אביזרים מתכתיים.

הצילומים מתבצעים בחדר המצלמה המיועד לכך. עליך לשכב על הגב בצורה נוחה ללא תזוזה.

ניתן לאפשר נוכחות מלווה אחד בחדר הצילומים.

המצלמה סורקת את גופך ומאתרת את פיזור החומר הרדיואקטיבי בגוף ובעיקר בלב.

המצלמה מתקרבת מאוד לגוף אך לא נוגעת בו.

הצילומים נמשכים כשעתיים לסירוגין. לעיתים תתבקש לרדת ממיטת הצילומים ולחזור שוב במועד מאוחר יותר.

בסיום הבדיקה תמתין לקבלת דיסק עם צילומי הבדיקה, ואז תוכל לצאת מהמחלקה.

הוראות לנבדק לפני הבדיקה:

1. על הנבדק לדווח לצוות המחלקה אם היא בהריון או מניקה.

הנחיות לאחר הבדיקה:

1. בסיום הצילומים תישאר בגופך כמות קטנה של חומר רדיואקטיבי, שלא מהווה סכנה לך או לסובבים אותך. עם זאת, מומלץ להרבות בשתייה במהלך היום.
2. יש להימנע ממגע הדוק וממושך עם ילדים ועם נשים הרות למשך שעה אחת מההזרקת.
3. לא להניק שעה 1 לאחר ההזרקת. ניתן לשאוב חלב במשך זמן זה ולהאכיל ע"י אדם אחר. החלב לא רדיואקטיבי.

בברכת בריאות שלמה

צוות המחלקה לרפואה גרעינית

PET/CT

טל. 02-6666910
פקס. 02-6666024
petct@szmc.org.il

רפואה גרעינית

טל. 02-6555520
פקס. 02-6666024
nuclear@szmc.org.il

המחלקה
לרפואה גרעינית
שערי צדק



NUCLEAR MEDICINE
SHAARE ZEDEK
MEDICAL CENTER