

הנחיות למטופלת ביום שאיבת ביציות ולקראת החזרת עוברים

מטופלת יקרה,
 להלן הדרכה אשר מטרתה היא לספק לך מידע והנחיות ליום שאיבת הביציות ולקראת החזרת עוברים.

ביום הפעולה

- ביום הגעתך תתקבלי ביחידה, תתבצענה בדיקות לחץ דם, דופק וחום הגוף, יוכנס עירוי לווריד לצורך מתן אנטיביוטיקה ונוזלים.
- תפגשי את הרופא המרדים אשר יחליט לגבי סוג ההרדמה המתאימה עבורך. כשעה לאחר מכן תיכנסי לחדר הניתוח. שאיבת הביציות אורכת כחצי שעה.
- בסיום שאיבת הביציות תועברי לחדר התאוששות שביחידה להשגחה, כעבור חצי שעה תוכלי לשתות ולאכול ובהמשך לרדת לשירותים.
- זמן ההתאוששות הממוצע כ – 3 שעות עד שחרורך הביתה.
- מומלצת מנוחה עד יום למחרת השאיבה.
- במידה ותרגישי אי נוחות / כאבי בטן ניתן להיעזר במשכך כאבים כגון אקמול, אופטלגין על מנת להקל על הכאבים .
- לעיתים עלול להופיע דמם / הפרשה חומה מהנרתיק – אל דאגה, זה צפוי וידוע.
- **אם מופיעים חום או כאבי בטן שאינם חולפים יש לפנות למיון.**

חשוב!

- שאיבת ביציות נעשית בהרדמה כללית, זמן ההרדמה קצר אך לידיעתך עד 24 שעות לאחר ההרדמה עלולות להופיע תופעות של ירידה בריכוז ובשיפוט, ולכן **חל איסור מוחלט על נהיגה וחובה להגיע עם מלווה.**

לאחר הפעולה

- לאחר שאיבת ביציות מומלץ לאכול ארוחה קלה ולהרבות בשתייה.
- בבוקר למחרת אנו נתקשר אלייך ונעדכן לגבי מספר העוברים שהופרו ולתאם מועד להחזרת העוברים.

הוראות הטיפול התרופתי:

מהיום בערב, בתאריך: ___/___/___:

1. להתחיל 1 כדור דוקסילין Doxylin (100מ"ג) וממחר להמשיך 1 בבוקר ו-1 בערב למשך 5 ימים.
סה"כ 2 כדורים ליום.
יש לקחת הכדור לאחר האוכל, עם כוס מלאה של מים.
2. להתחיל 2 כדורי מדרול Medrol (4 מ"ג) וממחר להמשיך 2 בבוקר ו-2 בערב למשך 5 ימים. סה"כ 4 כדורים ליום.
יש לקחת הכדור לאחר האוכל, עם כוס מלאה של מים.

מהיום בערב, בתאריך: ___/___/___ או ממחר בערב, בתאריך: ___/___/___:
(האחות תקיף בעיגול האפשרות שנבחרה על ידי המטופלת)

3. יש להתחיל עם תמיכת פרוגסטרון. יש לבחור אחת מבין האפשרויות הבאות:
 - א. 1/2 אמפולה (בזריקה תוך-שרירית) של גסטון Gestone = 25 מ"ג. (אין צורך במנוחה).
 - ב. 3 כדורים של אוטרוגסטן Utrogestan 100מ"ג לתוך הנרתיק. יש לשכב 1/2 שעה לאחר הנטילה.
 - ג. 1 כדור של אנדומטרין Engometrin 100מ"ג לתוך הנרתיק. יש לשכב 1/2 שעה לאחר הנטילה.
 - ד. 1 גיל של קרינון Crinone 8% לתוך הנרתיק. (אין צורך במנוחה).

ממחר, בתאריך: ___/___/___ או ממחרתיים, בתאריך: ___/___/___:
(האחות תקיף בעיגול האפשרות שנבחרה על ידי המטופלת)

הערה: יש להמשיך את התרופה בה התחלת להשתמש בסעיף 3 לעיל.

- א. גסטון Gestone – להעלות את המינון ל-1 אמפולה ביום (סה"כ 50 מ"ג ביום), בכל יום עד להודעה חדשה. (אין צורך במנוחה).
- ב. אוטרוגסטן Utrogestan 100מ"ג – להעלות את המינון ל 9 כדורים ביום לתוך הנרתיק (כלומר, 3 כדורים 3 פעמים ביום). כל יום עד להודעה חדשה.
יש לשכב 1/2 שעה לאחר הנטילה.
- ג. אנדומטרין Engometrin 100מ"ג – להעלות את המינון ל-2 כדורים ביום לתוך הנרתיק. (כלומר, כדור אחד, פעמיים ביום – אחד בבוקר ואחד בערב). כל יום עד להודעה חדשה.
יש לשכב 1/2 שעה לאחר הנטילה.
- ד. קרינון Crinone 8% – להמשיך 1 גיל בבוקר לתוך הנרתיק, כל יום עד להודעה חדשה. (אין צורך במנוחה).



חשוב:

ההוראות המדויקות מפורטות באתר האינטרנט של היחידה – יש להיכנס עם שם משתמש וסיסמא אישיים (שקיבלת בביקורך הראשון ביחידה).

נשמח לעמוד לרשותך בימים א-ה בין השעות 12:00-14:00 וביום ו' בין השעות 11:00-12:30
 בטלפון: 02-6666055.

בכל ביקור במרפאת IVF יינתן אישור חניה – פרטים במזכירות היחידה

היחידה להפריה חוץ-גופית